


BAREM VARIANTA 1 INFIRMIERE



1. SUBIECTUL NR. 1

2puncte pentru raspuns complet si corectX20intrebari= 40 PUNCTE

SE NOTEAZA DOAR RASPUNSURILE CORECTE SI COMPLETE!

1	A, B, C
2	A, C
3	A, B, C
4	A, B, C
5	A, B, C
6	A, B, C
7	A, C
8	A, B, C
9	A, B, C
10	A, B
11	B, C
12	A, B, C
13	A, B
14	A, C
15	A, C
16	B, C
17	A, B
18	A, B, C
19	B, C
20	A, B, C

2. SUBIECTUL NR. 2

Toaleta pacientului imobilizat - efectuarea procedurii – 30 pct (3X10=30 puncte)

1. Asigurați-vă ca temperatura din salon este peste 20°C
2. Asigurați-vă că geamurile și ușa să fie închise pe tot timpul procedurii
3. Așezați paravanul în jurul patului
4. Umpleți vasul 2/3 cu apă caldă (37°C—38°C), controlând temperatura apei cu termometrul de baie
5. Așezați pacientul în poziție decubit dorsal
6. Dezbrăcați și acoperiți cu un cearșaf pacientul
7. Luați pătura și așezați-o pe un scaun sau pe pat la picioarele bolnavului
8. Descoperiți progresiv numai partea care se va spală
9. Îndepărtați una dintre perne, iar pe cealaltă acoperiți-o cu o mușama și cearșaf, sau aleza
10. Puneți în fața bolnavului un prosop pentru a proteja învelitoarea

3. SUBIECTUL NR. 3

Alimentația pasivă – 30 pct (3X10=30 puncte)

1. Așezați pacientul în poziție șezand (dacă are membrele superioare afectate) sau semișezand (dacă este imobilizat, adinamic, epuizat, în stare gravă)
2. Protejați lenjeria de pat și de corp folosind prosoape curate
3. Plasați tava cu alimente pe noptieră, pe un taburet sau pe o măsuță adaptabilă la pat
4. Asezați-vă în partea dreaptă a pacientului (de regulă) pe un scaun, verificați temperatura alimentelor
5. Ridicați cu o mână (stanga) capul bolnavului cu pernă și administrați supă cu lingura pe jumătate plină
6. Asigurați-vă că pacientul a înghițit înainte de a administra o nouă cantitate
7. Rezervați-vă suficient timp pentru a putea face mici pauze dacă este nevoie
8. Tăiați alimentele în bucăți mici fără să le atingeți cu mâna
9. Incurajați pacientul să consume alimentele purtând o discuție agreabilă
10. Folosiți lingurița dacă pacientul este în stare foarte gravă sau are tulburări de deglutiție; observați permanent faciesul pacientului

Comisia,